

所定疾患施設療養費一覧表(令和3年度)

入所者	算定開始日	区分	日数	傷病名	検査	治療内容	内容	診断に至った根拠
様	令和03年04月20日	Ⅱ	10	蜂窩織炎	なし	投薬	4/20フロモックス3T3×1、4日間(昼より開始) 4/23(継続処方)フロモックス3T3×1、4日間 4/28(継続処方)フロモックス3T3×1、2日間	4/20右肘に発赤広範囲にあり。(右肘外側の発赤腫)熱感もあり。37.5℃
様	令和03年05月10日	Ⅱ	8	急性肺炎	CRP検査(5.7)	投薬	5/10ユナシン(375)2T2×1、サワシリン(250)3T3×1、各3日間 3/13ユナシン(330)2T2×1、サワシリン(250)3T3×1、各5日間 5/18 3/13ユナシン(330)2T2×1、サワシリン(250)3T3×1、各3日間	5/7乾性咳嗽あり、37.2℃。肺音(+)+多呼吸(+)+急性肺炎と診断 5/1038.3℃ CRP測定結果より投薬開始
様	令和03年05月07日	Ⅱ	10	蜂窩織炎	なし	投薬	5/7~9「点滴」ソルデム3号500ml×2、セファメジン1.0g×2 5/10フロモックス3T3×1 3日間 5/13フロモックス3T3×1 2日間	5/6発熱39.0℃。左大腿部発赤(2+)左臀部(3+)発赤(2+)腫脹、熱感あり。座薬にて解熱うながす。蜂窩織炎と診断。5/7より抗生剤にて投薬開始。
様	令和03年06月17日	Ⅱ	8	誤嚥性肺炎	CRP検査(8.22)	投薬	6/17フロモックス3T3×1 4日間 6/21フロモックス3T3×1 4日間	6/17咳(+)+痰(+)+37.1℃。CRP検査実施。誤嚥性肺炎と診断。
様	令和03年06月14日	Ⅱ	9	急性肺炎	CRP検査(6.65)	投薬	6/14フロモックス、ムコダイン、アスピリン、各3T3×1 2日間 6/16フロモックス、ムコダイン、アスピリン、各3T3×1 4日間 6/18(6/20~の分として)フロモックス、ムコダイン、アスピリン、各3T3×1 3日間	6/14湿性咳嗽あり。顔色不良、CRP検査指示。検査結果より急性肺炎と診断。
様	令和03年06月09日	Ⅱ	6	尿路感染症	尿検査(NIT(+)、LEU(2+))	投薬	6/9ホスミン500mg3T3×1.2日間 6/10(6/11~の分として)ホスミン500mg3T3×1.4日間	6/9回診、尿混濁、尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年06月23日	Ⅱ	10	尿路感染症	尿検査(PRO(3+)Leu(3+))	投薬	6/23ホスミン1.5g3T3×1、2日間 6/25ホスミン1.5g3T3×1、3日間 6/28クラビット(500)1T1×1.3日間 6/29(継続指示)クラビット(500)1T1×1.3日間	6/22尿混濁、尿量少ない。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年06月11日	Ⅱ	7	蜂窩織炎	なし	投薬	6/11フロモックス3T3×1、4日間 6/14(6/15~の分として)フロモックス3T3×1、3日間	6/11左足発赤、熱感ありとの報告。大転子~膝裏にかけて発赤。疼痛なし。蜂窩織炎と診断。
様	令和03年07月15日	Ⅱ	4	蜂窩織炎	CRP検査(4.59)	投薬	7/15 ユナシン(375)2T2×1、4日間	7/15頸部~胸背部発赤(+)+5:00発見 9:40回診拡大見られる CRP検査結果等より診断
様	令和03年07月13日	Ⅱ	6	蜂窩織炎	なし	投薬	7/13フロモックス3T3×1、6日間	7/13昨夜39℃発熱。左大腿外側の発赤。蜂窩織炎と診断。
様	令和03年07月15日	Ⅱ	4	尿路感染症	尿検査(尿一般・尿沈=色調:赤褐色、混濁:3+、比重:1.015、PH:7.0 糖:-、蛋白:3+、ケトン体:-、ウロビリノーゲン:1+、潜血:3+、ビリルビン:-、赤血球:5-9/每白血球:100以上/毎、扁平上皮:1個未満/毎硝子円柱:I-4/全、細菌:3+)	投薬	7/15ホスミン(500)3T3×1、4日間	7/15昨夜濃縮混濁尿多量にあり。尿検査実施。検査結果より診断。

様	令和03年07月15日	II	7	尿路感染症	尿検査(色調:淡黄色、混濁:1+、ウロビリノーゲン:±、潜血:±、細菌:3+)	投薬	7/15ホスミシン(500)3T3×1、4日間 7/19ホスミシン(500)3T3×1、3日間	7/13尿混濁あり。尿検査指示。検査結果より診断。
様	令和03年07月05日	II	7	尿路感染症	尿検査 (URO1+ BLD:2+ PRO2+LEU3+)	投薬	7/5クラビット(500)1T1×1、2日間 7/6継続処方クラビット(500)1T1×1、2日間 7/8継続処方クラビット(500)1T1×1、3日間	7/1パット交換ごとに排尿みられる。尿検査指示。検査結果より診断。
様	令和03年07月15日	II	7	尿路感染症	尿検査(尿一般・尿沈=色調:淡黄色、混濁:1+、糖:±、ウロビリノーゲン:±、細菌:3+)	投薬	7/15ホスミシン(500)3T3×1、4日間 7/19ホスミシン(500)3T3×1、3日間	7/13入所時状態把握検査として、尿検査実施。検査結果より診断。
様	令和03年07月15日	II	7	尿路感染症	尿検査(潜血:1+、蛋白:2+) CRP(0.7)	投薬	7/15ホスミシン(500)3T3×1、4日間 7/19ホスミシン(500)3T3×1、3日間	7/13入所時状態把握検査として、尿検査実施。検査結果より診断。
様	令和03年07月28日	II	3	尿路感染症	尿検査(色調:淡黄褐色、混濁:1+、蛋白:±、潜血:3±、細菌:3+、CRP=7.82)	投薬	7/26クラビット(500)1T1×1、2日間 7/27クラビット(500)1T1×1、3日間継続処方【7/26・27・28・29・30クラビットのうち28・29・30の3日間算定する】	7/26痰がらみ(+)湿性咳嗽(+)顔色不良にて、上気道炎疑い投薬。CRP検査尿検査等指示。CRP・血液検査より、誤嚥性肺炎疑い。7/27投薬継続指示。7/28尿検査結果より、尿路感染症と診断。
様	令和03年07月14日	II	6	帯状疱疹	なし	投薬	7/14ゾピラックス(200)1回2T1日5回、6日間	7/14腰背部～下腹部へ水泡形成、発赤(+)、帯状疱疹と診断。
様	令和03年08月05日	II	10	急性肺炎	CRP検査(2.98)	投薬	8/5クラビット(7.5)、アスピリン、ムコダイン、各3T3×1、ユナシン(375)2T2×1、2日間 8/6(7～継続処方)サワシリン(7.5)、アスピリン、ムコダイン、各3T3×1、ユナシン(375)2T2×1、4日間 8/10(薬剤変更)サワシリン(7.5)3T3×1、ユナシン(335)2T2×1、2日間 8/12(継続処方)サワシリン(7.5)3T3×1、ユナシン(335)2T2×1、4日間	8/4咳(+)痰(+)肋骨の痛み(+)肺炎疑い セファメジンにて様子観察 8/5検査結果より、肺炎と診断。
様	令和03年08月11日	II	7	尿路感染症	尿検査(白血球20-29、細菌3+) CRP検査(3.03)	投薬	8/11ホスミシン(250)3T3×1、5日間 8/16ホスミシン(250)3T3×1、2日間	8/11前日発熱(+)尿混濁(+)、検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年08月24日	II	6	尿路感染症	尿検査 (BLD:3+0.75mg/dl BIL- KET- GLU- P RO+-15mg/dl pH7.0)	投薬	8/24クラビット(250)2T2×1、2日間 8/26クラビット(250)2T2×1、4日間	8/24体熱感あり、風邪症状なし。検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年08月18日	II	10	尿路感染症	尿検査(白血球3+、比重1.010、細菌3+)	投薬	8/18ホスミシン(500)3T3×1、2日間 8/20ホスミシン(500)3T3×1、4日間 8/24ホスミシン(500)3T3×1、4日間	8/18食事摂取量減少のため尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年08月03日	II	8	尿路感染症	尿検査(比重1.010、LEU=3+細菌3+) CRP検査(9.05)	投薬	8/3フロモックス、アスピリン、ムコダイン、各3T3×1、4日間 8/6(7～継続処方)フロモックス、アスピリン、ムコダイン、各3T3×1、4日間	8/3体温37.2℃、検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年08月04日	II	3	尿路感染症	尿検査(WBC≥100)	投薬	8/4フロモックス3T3×1、1日間 8/5フロモックス3T3×1、2日間	8/2発熱あり。尿検査指示。8/4検査結果より尿路感染症と診断。

様	令和03年09月10日	II	9	急性肺炎	CRP検査(7.28)	投薬	9/10タ〜フロモックス3T3×1、3日間 9/13継続処方フロモックス3T3×1、3日間 9/17フロモックス3T3×1、2日間	9/10発熱38.3℃ コロナール処方する CRP検査指示。検査結果より急性肺炎と診断。
様	令和03年09月14日	II	10	尿路感染症	CRP検査(12.57)	投薬	9/14ホスミン(250)3T3×1、3日間 9/17ホスミン(250)3T3×1、4日間 9/18ホスミン在庫なし9/19朝よりクラビット(500)1T1×1、4日間へ変更 9/22ホスミン(250)3T3×1、2日間	9/12発熱38.5℃ クーリング・コロナール処方しつつ、CRP検査指示。検査結果状態より尿路感染症と診断。
様	令和03年09月22日	II	10	尿路感染症	尿検査(潜血1+ PRO1 + NIT+ LEU3+) CRP検査(10.65)	投薬	2021/9/22ホスミン(500)1T1×1、2日間 9/24ホスミン(500)2T2×1、3日間 9/27クラビット(500)1T1×1、3日間 9/29継続処方クラビット(500)1T1×1、2日間	9/21夜発熱39.1℃。CRP検査・尿一般指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年09月24日	II	9	尿路感染症	尿検査(LEU=2+75)	投薬	9/24ホスミン(250)3T3×1、3日間 9/27フロモックス3T3×1、ムコダイン3T3×1、各3日間 9/30フロモックス3T3×1、ムコダイン3T3×1、各3日間	9/22発熱あり。尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年09月16日	II	6	尿路感染症	尿検査(URO1+2.0 PRO1+30 NIT+LEU3+500)	投薬	9/16ホスミン(500)2T2×1、4日間 9/18ホスミン在庫なしクラビット(500)1T1×1、4日間へ変更	9/15発熱。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年09月29日	II	10	尿路感染症	尿検査(混濁1+、比重1.010 PH8.5 糖-蛋白± 燐酸アンモニウム2+細菌3+)	投薬	9/29ホスミン(500)3T3×1、ムコダイン3T3×1、各2日間 10/1ホスミン(500)3T3×1、ムコダイン3T3×1、各3日間 10/4クラビット(500)1T1×1、3日間 10/7クラビット(500)1T1×1、3日間	9/29回診にて四肢冷感、両杯湿性ラ音あり。顔面やや浮腫みられる。各種検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年09月29日	II	5	尿路感染症	尿検査(潜血+-、NIT+、LDU3+)	投薬	9/29クラビット(500)1T1×1、3日間 10/1(継続処方)クラビット(500)1T1×1、2日間	9/29回診時、四肢冷感(+)左足背浮腫(+)尿検査他指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年10月22日	II	8	肺炎	CRP検査(8.86)	投薬	10/22ユナシン(375)2T2×1、サワシリン(250)4T4×1、各3日間 10/25クラビット(500)1T1×1、アスペリン3T3×1、ムコダイン3T3×1、クエチアピン5T3×1、各2日間 10/26クエチアピン(25)6T3×1、クラビット(500)1T1×1、アスペリン3T3×1、ムコダイン3T3×1、各2日間継続処方 10/28ミノマイシン(100)1T1×1、2日間(クラビットと併用)	10/22左肺呼吸音弱、湿性ラ音(+)、CRP検査実施。検査結果より肺炎と診断。
様	令和03年10月04日	II	10	尿路感染症	尿一般(ビルビリン(+))蛋白(+))白血球(3+))	投薬	10/4重曹2.0g3×1、ホスミン(500)3T3×1、各3日間 10/7重曹2.0g3×1、ホスミン(500)3T3×1、各5日間 10/12重曹2.0g3×1、3日間	10/4回診、フォーレ詰まり多く、尿混濁著明、浮遊物多い。尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年10月04日	II	10	尿路感染症	尿一般(潜血(+))ビルビリン(+))白血球(3+))	投薬	10/4ホスミン(250)3T3×1、3日間 10/7ホスミン(250)3T3×1、5日間 10/12ホスミン(250)3T3×1、3日間	10/4Hrやや濃縮。尿一般検査。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年10月01日	II	6	蜂窩織炎	CRP検査(4.48)	投薬	10/1フロモックス3T3×1、3日間 10/4フロモックス(100)3T3×1、3日間	10/1回診にて、右背中〜腰、臀部にかけ発赤あり。熱感(+)、CRP検査、蜂窩織炎と診断。
様	令和03年10月07日	II	5	蜂窩織炎	なし	投薬	10/7 フロモックス(100)3T3×1、5日間	10/7左臀部広範囲に発赤、熱感あり。発熱39℃。
様	令和03年11月04日	II	2	尿路感染症	尿一般(潜血(3+))蛋白(+))白血球(3+))	投薬	11/4フロモックス(100)3T3×1、2日間	11/4回診時、尿混濁あり。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年11月01日	II	8	尿路感染症	尿一般(潜血(2+))尿蛋白(2+))白血球(3+))	投薬	11/1ホスミン(500)2T2×1、2日間 11/2クラビット(500)1T1×1、2日間 11/4クラビット(500)1T1×1、5日間	11/1 39℃発熱。CRP検査・尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年11月18日	II	7	尿路感染症	尿一般(尿蛋白(2+))白血球(3+))	投薬	11/18フロモックス3T3×1、2日間 11/19(継続処方)フロモックス3T3×1、3日間 11/22フロモックス3T3×1、2日間	11/18倦怠感、左腰部痛あり。若干尿混濁あり。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。

様	令和03年11月16日	II	4	尿路感染症	尿一般(潜血(3+))	処置(点滴)	11/16.17.18.19 点滴:ソルデム1号500ml1本ソルデム3号500ml1本.VB1+VC	11/16発語なく活気なし。両下腿～足背浮腫軽度。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と脱水と診断。
様	令和03年11月17日	II	10	蜂窩織炎	診断	投薬	11/17フロモックス3T3×1、3日間 11/19ユナシン(375)2T2×1、サワシリン(250)4T4×1、各3日間 11/22ユナシン(375)3T3×1、2日間 11/24ユナシン3T3×1、3日間	11/17発熱40.1℃。右下腿発赤(+)。診察の結果蜂窩織炎と診断。
様	令和03年12月18日	II	7	尿路感染症	尿検査(URO1+ PRO1+- LEU3+)	投薬	12/18ホスミン(250)4T4×1、3日間 12/21ホスミン(250)4T4×1、3日間 (12/24飲み切り中止)	12/18発熱38.5℃。尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和03年12月22日	II	7	尿路感染症	尿検査URO3+ BLO3+ BLI2+ KET- GLU- PRO+ph6.0 NIT+ LEU3+ S.G.1.020)	投薬	12/22ホスミン(500)3T3×1、3日間屋より 12/24継続処方ホスミン(500)3T3×1、3日間	12/22体熱感軽度。ハルンバッグに血尿あり。尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年01月06日	II	6	肺炎	CRP検査(6.35)	投薬	1/6点滴(ソルデム1号500ml・3号500ml・セファメジン×2) 1/7点滴(3号500ml・セファメジン1.0g×2) 1/8フロモックス3T3×1・4日間	1/6泡沫状痰中等量吸引。発熱37.4℃。CRP検査指示。検査結果より肺炎と診断。
様	令和04年01月06日	II	10	誤嚥性肺炎	CRP検査(9.92)	投薬	1/6点滴(ソルデム1号500ml・3号500ml・セファメジン×2) 1/7フロモックス4T4×1・4日間(7日の夕～) 1/11フロモックス4T4×1・4日間継続 1/14フロモックス・アズベン各4T4×1・3日間継続	1/6唸り声・時々痰・茶色痰+・CRP検査指示。検査結果より誤嚥性肺炎と診断。
様	令和04年01月14日	II	5	急性肺炎	CRP検査(12.98)	投薬	1/14～18点滴(ソルデム3号750ml・セファメジン1.0g×2)	1/14四肢末端冷感・両足底チアノーゼ・血圧116/76・CRP検査指示。検査結果より急性肺炎と診断。
様	令和04年01月04日	II	10	急性肺炎	CRP検査(11.56)	投薬	1/4クラビット(500)1T1×1、2日間 1/5継続処方クラビット(500)1T1×1、5日間 アスベリン3t、ムコダイン3t、各3×1・5日間ホクナリンテープ2mg1×1・5日間 1/11継続処方クラビット(500)1T1×1、4日間 アスベリン3t、ムコダイン3t、各3×1・4日間ホクナリンテープ2mg1×1・4日間	1/4回診。体温37.5℃・食欲+喘鳴+無呼吸+、CRP検査指示。検査結果より急性肺炎と診断。
様	令和04年01月05日	II	4	急性肺炎	CRP検査(5.08)	投薬	1/5～8点滴(ソルデム1号500ml・3号500ml・セファメジン1.0×2)	1/5回診。熱+咳+痰+、CRP検査指示。検査結果より急性肺炎と診断。
様	令和04年01月12日	II	10	急性肺炎	CRP検査(27.54)	投薬	1/12点滴(ソルデム1号500ml・3号500ml・セファメジン×2) 1/13点滴(ソリタ3500ml×11・セファメジン1.0g×2) 1/14フロモックス、アスベリン、ムコダイン各3T3×1、ホクナリンテープ2mg1×1、各5日間 1/18継続処方フロモックス、アスベリン、ムコダイン各3T3×1、ホクナリンテープ2mg1×1、各2日間 1/21継続処方フロモックス、アスベリン、ムコダイン各3T3×1、ホクナリンテープ2mg1×1、各4日間	1/10発熱38.3℃・湿性咳嗽+、黄色粘稠痰喀出、CRP検査指示。検査結果より急性肺炎と診断。検査結果1/12にて、1/12より算定開始。
様	令和04年01月07日	II	6	尿路感染症	尿検査(URO2+BLD3+)	投薬	1/7 屋より ホスミン(500)3T3×1、5日間	1/7回診。発熱37.5℃。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年01月21日	II	7	尿路感染症	尿検査(URO(-)BLD(3+)BIL(-)KET(-)GLU(-)PRO(2+)pH(6.5)NIT(+))LEU3+)	投薬	1/21ホスミン(500)2T2×1、5日間 1/26ホスミン(500)2T2×1、2日間	1/20微熱あり。1/21回診眩暈訴えあり。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年01月07日	II	5	蜂窩織炎	診察	投薬	1/7フロモックス3T3×1、4日間 1/9投薬変更(1/10・11)クラビット(500)1T1×1、2日間	1/7回診、左下腿発赤+、蜂窩織炎と診断。1/6上気道炎にて抗生剤処方済み。(1/6夕～フロモックス3T3×1、5日間)
様	令和04年02月21日	II	7	尿路感染症	尿検査(BLD3+、PRO2+、NIT+ LEU2+)	投薬	2/21ホスミン(500)2T2×1、4日間 2/25ホスミン(500)2T2×1、3日間	2/21回診 尿混濁(+)尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。

様	令和04年02月03日	II	2	尿路感染症	尿検査(潜血1+、尿糖3+、尿蛋白1+、白血球3+)	投薬	2/3ホスミシン(500)2T2×1、2日間	2/3発熱、全身浮腫中等度、尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年02月28日	II	8	尿路感染症	尿検査(BLD±0.03mg/dl BIL2+1.0mg/dl KET2+GLU- PRO1+30mg/dl PH6.0 NIT+ LEU3+500c/ul S.G. 1.020)	投薬	2/28(昼から)フロモックス3T、アスピリン3T、ムコダイン3T、各3×1、2日間 3/1継続処方フロモックス3T、アスピリン3T、ムコダイン3T、各3×1、5日間	2/28尿混濁、湿性咳嗽あり。CRP検査、尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。(肺炎も診断)
様	令和04年02月25日	II	8	蜂窩織炎	診察	投薬	2/25(夕～開始)フロモックス3T3×1、4日間 3/1継続処方フロモックス3T3×1、3日間	2/25背部～腰部の広汎な発赤、発熱あり38.9℃。蜂窩織炎と診断。
様	令和04年02月10日	II	8	蜂窩織炎	診察	投薬	2/10(昼から)フロモックス3T3×1、4日間 2/14継続処方フロモックス3T3×1、3日間	2/10左大腿外側発赤、熱感持続。蜂窩織炎と診断。
様	令和04年03月08日	II	7	蜂窩織炎	診察	投薬	3/8夕から、フロモックス3T3×1、3日間 3/11継続処方、フロモックス3T3×1、3日間	3/8悪寒あり。右腰部～背部に発赤見られる。診察の結果、蜂窩織炎と診断。