

所定疾患施設療養費一覧表(令和4年度)

入所者	治療開始日	区分	治療日数	傷病名	検査	治療内容	内容	診断に至った根拠
様	令和04年04月10日	Ⅱ	7	蜂窩織炎	診察	投薬	4/10(昼より開始)フロモックス3T3×1、3日間 4/12継続処方、フロモックス3T3×1、3日間	4/10回診 昨夜嘔吐大量(+) 発熱(+) ラ音(-) 右下肢発赤(+) 蜂窩織炎と診断。
様	令和04年04月10日	Ⅱ	6	蜂窩織炎	診察	投薬	4/10(昼より開始)フロモックス3T3×1、3日間 4/12継続処方、フロモックス3T3×1、2日間	4/10回診 顔の発赤(+) 触ると痛い 発熱37.7℃ 蜂窩織炎と診断。
様	令和04年05月16日	Ⅱ	4	尿路感染症	尿検査(BLD+、BIL+、NIT+、LEU3+)	投薬	5/16(昼より開始)ホスミン1.5、3×1、3日間	5/16入所時検査 尿検査実施したところ検査結果より診断。
様	令和04年05月06日	Ⅱ	7	蜂窩織炎	診察	投薬	5/6(昼より開始)フロモックス3T、3×1、3日間 5/19(昼より開始)フロモックス3T、3×1、3日間	5/6右耳下～顎にかけ発赤、腫脹(+) 。診察の結果、蜂窩織炎と診断。
様	令和04年05月16日	Ⅱ	8	蜂窩織炎	診察	投薬	5/16(昼より開始)フロモックス3T、3×1、4日間 5/20(昼より開始)フロモックス3T、3×1、3日間	5/16入浴時、左足発赤発見。回診にて左大腿部～下肢にかけて熱感、発赤確認。蜂窩織炎と診断。
様	令和04年06月22日	Ⅱ	4	尿路感染症	尿検査(BLD2+、PRO1+、NIT+、LEU3+)	投薬	6/22夕～ホスミン(500)3T3×1、3日間	6/22 発熱38.2℃ 回診時、尿検査指示、検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年06月17日	Ⅱ	4	尿路感染症	尿検査(BLD+、PRO2+、NIT+、LEU2+)	投薬	6/17昼～ホスミン(500)3T3×1、3日間	入所時検査、尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年06月17日	Ⅱ	8	尿路感染症	尿検査(BLD2+、NIT+、LEU3+)	投薬	6/17昼～ホスミン(500)3T3×1、3日間 6/20継続処方ホスミン(500)3T3×1、4日間	入所時検査、尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年06月08日	Ⅱ	7	蜂窩織炎	診察	投薬	6/8昼～フロモックス3T3×1、3日間 6/10継続処方フロモックス3T3×1、3日間	左大腿部発赤熱感(+) 診察により、蜂窩織炎と診断。
様	令和04年06月03日	Ⅱ	7	蜂窩織炎	診察	投薬	6/3昼～フロモックス3T3×1、3日間 6/6継続処方フロモックス3T3×1、3日間	左腰部発赤熱感(+) 、発熱39.5℃。診察により、蜂窩織炎と診断。
様	令和04年06月13日	Ⅱ	10	帯状疱疹	診察	投薬	6/13アシクロビル軟膏塗布4日間 6/17昼～アシクロビル(200)4T4×1、3日間 6/20継続処方アシクロビル(200)4T4×1、3日間	右胸～右背部発疹あり。診察により帯状疱疹と診断。
様	令和04年06月26日	Ⅱ	10	帯状疱疹	診察	投薬	6/26アシクロビル軟膏塗布 アシクロビル4T4×1、2日間 6/27多田皮膚科受診 アシクロビル4T4×1、7日間 6/28日赤外来受診 投薬変更 アズノール軟膏一日1回塗布 アメナリーフ200mg 2T他 7/4再診予定 7/4 日赤受診 アズノール軟膏一日1回塗布継続 7/8再診予定まで	6/26左顔面～頭頂部発赤水泡(+) 両眼瞼浮腫(+) 搔痒感(+) 痛み(-) 診察により帯状疱疹と診断。
様	令和04年07月14日	Ⅱ	10	尿路感染症	尿検査(BLD2+、BIL-、KET-、GLU2+、PRO1+、NIT+、LEU3+)	投薬	7/14～18点滴ソルデム1号500ml、セファメジン1.0g×2 7/19ホスミン(500)2T、2×1、3日間 7/22ホスミン(500)2T、2×1、4日間	7/13より発熱39℃。咳(+) 痰(+) 唸り声(+) 尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年07月19日	Ⅱ	10	蜂窩織炎	診察	投薬	7/19フロモックス3T3×1、3日間 7/22フロモックス3T3×1、4日間 7/26フロモックス3T3×1、3日間 7/29フロモックス3T3×1、3日間	7/19回診、前腕発疹(+) 顔、特に左耳 発赤・腫脹(+) 排膿(+) 。診察の結果、蜂窩織炎と診断。

様	令和04年08月19日	II	10	肺炎	CRP(12.15)	投薬	8/19フロモックス3T3×1, 4日間 8/23フロモックス3T3×1, 3日間 8/26フロモックス3T3×1, 3日間	8/19湿性咳嗽、痰がらみあり。CRP検査実施。診察、検査結果より肺炎と診断。
様	令和04年08月26日	II	10	尿路感染症	尿検査(Hr混濁(+))LEU(3+)	投薬	8/26ホスミン(500)3T3×1, 3日間 8/29ホスミン(500)3T3×1, 3日間 9/2ホスミン(500)3T3×1, 3日間	8/26悪寒、体熱感著明。尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年08月30日	II	10	蜂窩織炎	診察	投薬	8/29フロモックス3T3×1, 3日間 8/1継続処方フロモックス3T3×1, 4日間 9/5フロモックス3T3×1, 3日間	8/29右膝腫脹 発赤 投薬開始 8/30診察にて蜂窩織炎と診断。
様	令和04年08月01日	II	10	蜂窩織炎	診察	投薬	8/1フロモックス3T3×1, 3日間 8/4フロモックス3T3×1, 4日間 8/8ユナシン(375)2T2×1, 3日間	8/1左足背部発赤膨張(+)診察により、蜂窩織炎と診断。
様	令和04年08月16日	II	9	带状疱疹	診察	投薬	8/16屋～アシクロビル(400)4T, 4×1, 3日間 8/19アシクロビル(400)4T, 4×1, 3日間 8/22アシクロビル(400)4T, 4×1, 2日間	8/16昨日より左胸腹部にヘルペス様発赤、痛み(+)。診察により带状疱疹と診断。
様	令和04年09月07日	II	10	尿路感染症	尿検査(BLD3+, PRO2+, LEU3+)	投薬	9/7ホスミン(500)2T2×1, 3日間 9/9継続処方ホスミン(500)2T2×1, 3日間 9/13ホスミン(500)2T2×1, 3日間 9/16カロナール3T, クラビット(500)1T, 3日間	9/7回診、尿混濁(+)発熱38.6℃ CRP5.25 尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年09月26日	II	7	蜂窩織炎	診察	投薬	9/26～29点滴ルデム1号500ml, ヴルデム3号500ml+VB1+VC+セファメジン1.0g×2 9/30～10/2ルデム3号500ml×2, +VB+VC+セファメジン1.0g×2	9/26臀部～腰部の発赤、熱感確認。回診により蜂窩織炎となる。
様	令和04年09月26日	II	7	蜂窩織炎	診察	投薬	9/26夕～フロモックス3T3×1, 3日間 9/28継続処方フロモックス3T3×1, 3日間	9/26右臀部～腰部に発赤、熱感、腫脹あり。CRP検査実施(18.39)、蜂窩織炎と診断。
様	令和04年10月17日	II	10	尿路感染症	尿検査(BLD2+, PRO4+, LEU3+膿様尿)	投薬	10/17夕からホスミン(500)3T3×1, 2日間 10/19継続処方ホスミン(500)3T3×1, 5日間 10/24継続処方ホスミン(500)3T3×1, 3日間	10/17回診、発熱38.4℃ 尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年10月21日	II	7	尿路感染症	尿検査(BLD3+, PRO1+30, LEU3+500 混濁あり)	投薬	10/21夕からホスミン(500)3T3×1, 6日間	10/21発熱37.5℃。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年10月07日	II	7	尿路感染症	尿検査(BLD2+, PRO3+, B IL-, KET-, GLU-, ph6.0, LEU3+)	投薬	10/7夕からクラビット(500)1T1×1, 4日間 10/11継続処方クラビット(500)1T1×1, 3日間	10/6発熱39.2℃。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年10月19日	II	7	尿路感染症	尿検査(BLD3+, 蛋白3+, 白血球3+, 尿比重1.015)	投薬	10/19夕からホスミン(500)3T3×1, 2日間 10/21継続処方ホスミン(500)3T3×1, 4日間	10/19入所時回診、尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年11月07日	II	6	尿路感染症	尿検査(BLD2+, 蛋白1+, 白血球3+, 尿比重1.010)	投薬	11/7クラビット(500)1T1×1, 3日間 11/10クラビット(500)1T1×1, 3日間	11/7発熱38℃。回診時尿検査、採血指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年11月11日	II	7	蜂窩織炎	診察	投薬	11/11昼からフロモックス3T3×1, 4日間 11/14昼からホスミン(500)3T3×1, 3日間へ変更	11/11回診。左前腕に発赤、腫脹(+)。診察により蜂窩織炎と診断。
様	令和04年11月25日	II	10	蜂窩織炎	診察	投薬	11/25昼よりフロモックス3T3×1, 4日間 11/30昼よりフロモックス3T3×1, 4日間	11/25回診。左前腕の発赤腫脹(+), 浮腫(+). 診察により蜂窩織炎と診断。
様	令和04年12月20日	II	10	尿路感染症	尿検査(混濁(+))	投薬	12/20ホスミン(500)2T2×1, 4T 12/23継続処方ホスミン(500)2T2×1, 4T 12/27クラビット(500)2T2×1, 2日間 12/28継続処方クラビット(500)2T2×1, 5日間	12/20チアノーゼ(+) 左足背浮腫(+), 尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。

様	令和04年12月05日	II	7	尿路感染症	尿検査(URO:1+, BLD:2+, NIT:+, LEU:3+)	投薬	12/5日からホスミン(500)3T3×1, 3日間 12/7継続処方ホスミン(500)3T3×1, 3日間	12/5体動時疼痛(+)体熱感あり、フォーレ管内淡血性の排尿(+), 尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和04年12月14日	II	6	带状疱疹	診察	投薬	12/14日から アシクロビル(200)4T 2:1:1 5日間	12/14回診 右側腹部带状疱疹
様	令和05年01月13日	II	9	尿路感染症	尿検査(BLD3+, PRO2+, LEU3+)	投薬	1/13昼より開始ホスミン(500)3T3×1, 4日間 1/17継続処方ホスミン(500)3T3×1, 4日間	フォーレ、尿混濁、尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年01月23日	II	10	尿路感染症	尿検査(URO2+, BLD2+, NIT+, LEU3+)	投薬	1/23日から開始 ホスミン(500)2T2×1, 朝夕、3日間処方 1/25継続処方ホスミン(500)2T2×1, 4日間処方	1/23発熱37.3°C。尿バッグ内尿混濁、浮遊物(+)。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年02月17日	II	10	尿路感染症	尿検査(URO1+, NIT+BLD2+, LEU3+, PRO1+)	投薬	2/17ホスミン(500)3T3×1, 4日間 2/20継続処方ホスミン(500)2T2×1, 4日間 2/24継続処方ホスミン(500)2T2×1, 3日間	2/17体熱感あり。38.2°C。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年02月14日	II	10	尿路感染症	尿検査(URO1+, BLD2+, PRO1+NIT+, LEU3+, 濃縮尿)	投薬	2/14ホスミン(500)2T2×1, 3日間 2/17継続処方ホスミン(500)2T2×1, 3日間 2/20継続処方ホスミン(500)2T2×1, 4日間	2/14回診時、38°C。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年03月15日	II	2	急性肺炎	CRP検査(0.85)	投薬	3/14ムコダイン3T3×1, 3日間	3/6発熱37.8°C。胸部肺下葉湿性ラ音あり。急性肺炎と診断。投薬開始。3/14血液検査、CRP検査実施。3/15結果届く。3/15と3/16投薬について加算算定とする。
様	令和05年03月03日	II	10	尿路感染症	尿検査(BLD-2+0, 15ml/dl PRO-2+100mg/dl, LEU-3+500c/uL)	投薬	3/3タ〜ホスミン(500)2T2×1, 3日間 3/6継続処方ホスミン(500)2T2×1, 5日間 3/8処方変更クラビット(500)3T3×1, 2日間 3/10継続処方クラビット(500)3T3×1, 3日間	3/3発熱41.7°C。コロナ、インフル検査陰性。尿検査実施。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年03月30日	II	6	尿路感染症	尿検査(URO1+, BLD1+, BIL3+, PRO1+, NIT1+, LEU3+)	投薬	3/30タ〜ホスミン(500)2T2×1, 5日間	3/30発熱38.6°C。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年03月01日	II	10	尿路感染症	尿検査(尿混濁、BLD1+, PRO2+, NIT+, LEU3+)	投薬	3/1ホスミン(500)2T2×1, 5日間 3/6ホスミン(500)2T2×1, 5日間	3/1発熱36.8°C。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年03月07日	II	10	尿路感染症	尿検査(BLD2+, BIL-KET-GLU- PRO2+, PH8.5 NIT+, LEU3+)	投薬	3/7タよりホスミン(500)2T2×1, 3日間 3/10継続投薬変更クラビット(500)2T2×1, 2日間 3/13クラビット(500)2T2×1, 4日間 3/17クラビット(500)2T2×1, 3日間	3/7排尿痛。尿検査指示。検査結果より尿路感染症と診断。
様	令和05年03月10日	II	10	带状疱疹	診察	処置	3/10〜アシクロビル軟膏塗布、毎日開始。3/27軟膏塗布中止。	3/10左腰部赤い丘疹。診察し、带状疱疹と診断。